



חינוך למטופל ולמטפל

# התמודדות וניהול של COVID-19 בבית: מידע למטפליים

מידע זה מסביר מה לעשות בבית אם את/ה מטפל/ת באדם החולים או שעלול/ה להיות חולה בגיןיה הקורונה (COVID-19). בפרק זה, המילה "המטפל/ת" מתייחסת לאדם בו את/ה מטפל/ת.

יש להימנע מלטפל באדם החולים ב-19-COVID אם יש לך מצבים רפואיים כרוניים כלשהם או מערכת חיסון חלה. אם יש לך שאלות בנוגע להאם עליך לטפל במישהו/י חולה או שעלול/ה להיות חולה ב-19-COVID, אנא שוחחי עלייך עם הרופא המטפל.

## עזרה למטופל/ת לניהול והתמודד עם התסמים

תוכל/י לסייע למטופל/ת לניהול התסמים אותם הוא/היא חוות על ידי מתן תרופות ללא מרשם לשפעת, ארכחות קלות ושתייה מרובה של נזלים. כמו כן יש לוודא מדידת חום פעמיים ביום. למידע נוספת על ניהול תסמי 19-COVID, ניתן לקרוא בפרק *התמודדות וניהול של COVID-19 בבית*.  
[www.mskcc.org/he/cancer-care/patient-education/managing-covid-19-home](http://www.mskcc.org/he/cancer-care/patient-education/managing-covid-19-home).

וודאי שאתה יודעת כיצד ליצור קשר עם הרופא של המטופל/ת. יש ליצור קשר עם הרופא המטפל באופן מיידי:

- אם קיים קושי בנשימה בעתמנוחה.
- אם קיים קושי בנשימה בעת הליכה למרחק קצר. מרחק קצר הוא למשל מעבר מחדר אחד לשני, כ-6 מטר.
- המטופל/ת מקבל/ת טיפול כימותרפי וסובל/ת מחום חדש של 38 מעלות צלזוס ומעלה.
- המטופל/ת סובל/ת מחום של  $102^{\circ}\text{F}$  ( $38.9^{\circ}\text{C}$ ) ומעלתה הנמשך 24 שעות ואינו משתפר לאחר נטילת אצטמיןופן (Tylenol®).
- יש דם בליהה של המטופל/ת (לייחה העולה בעת שיעול).
- יש לו/ה כאבים בחזה.

- יש לו/ה כאב ראש חמוץ.
- יש לך או לו/ה שאלות או חששות.

## **כיצד למנוע התפשטות של COVID-19**

COVID-19 מועבר בקלות מאדם לאדם. הוא יכול להתפשט דרך טיפות באוויר או להישאר על משטחים לאחר שאדם חולה משתמש או מתעטש. הוא עשוי להתפשט גם במקרה שימושו נוגע באדם חולה ואז נוגע בעיניים, באף או בפה.

יש לעקב אחר ההוראות בסעיף זה כדי לסייע במניעת התפשטות COVID-19 לאנשים שבביתי ובקהילה שלך.

### **סוגי בדיקות לנגיף הקורונה (COVID-19).**

כיום קיימים 2 סוגי בדיקות לאבחן נגיף הקורונה (COVID-19)

- בדיקת PCR, הנקרأت גם בדיקה מולקולרית. בדיקות PCR הן בדיקות מדויקות מאוד, אולם עשויים לחלוּפּ מספר ימים עד לקבל תוצאות הבדיקה.
- בדיקה מהירה, הנקראות גם בדיקת אנטיגן. בדרך כלל ניתן לקבל את תוצאות הבדיקה מהירה בתוך פחת משעה. אולם בדיקות מהירות נוטות יותר לתוצאות שליליות שגויות מאשר בדיקות PCR. המשמעות היא שבבדיקות מהירות נוטות יותר להראות של אדם אין COVID-19 בעוד שבפועל יש לו. אם למטופל/ת יש תסמינים של COVID-19 והתקבלה תוצאה בדיקה מהירה שלילית, עדיף לבצע בדיקת PCR כדי לוודא את הדבר.

בשני סוגי הבדיקות, המטופל/ת ת/יקבל תוצאה חיובית או שלילית. תוצאה חיובית פירושה שהבדיקה הרואה שלמטופל/ת יש COVID-19. תוצאה שלילית פירושה שהבדיקה לא ראהה שלמטופל/ת יש COVID-19.

### **מתי לעקוב אחר הוראות אלה**

- אם למטופל/ת יש תסמינים של COVID-19 והוא/היא ממתין/ה לתוצאות הבדיקה, יש להמשיך לעקב אחר הוראות אלה עד ש:
  - הוא/היא מקבל/ת תוצאות בדיקה שליליות. אם המטופל/ת ביענה בדיקה מהירה וקיים/ה תוצאה שלילית, עליו/ה לבצע בדיקת PCR כדי לוודא את התוצאות. יש לעקב אחר הוראות אלה עד לקבלת תוצאה שלילית של בדיקת PCR.
- אם למטופל/ת אין תסמינים של COVID-19 והוא/היא ממתין/ה לתוצאות הבדיקה, יש להמשיך

לעקב אחר הוראות אלה עד ש:

- הוא/היא מקבל/ת תוצאות בדיקה שליליות.
- אם למטופל/ת יש COVID-19 והוא/היא סובל/ת מטאימים, יש להמשיך לעקב אחר הוראות אלה עד ש:
  - חלפו לפחות 3 ימים מאז שנמדד לאחרונה חום מעל C<sup>°</sup> 38 (F<sup>°</sup> 100.4) מבל' לשימוש בתרופות להורדת חום. דוגמאות לתרופות שכאהו כוללות אצטמיןופן (Tylenol®), איבופרפון (Advil®), נפרוקסן (Aleve®), אספירין במינון מלא (יותר מ-81 מ"ג ביום) ואינדורמתצין (Tivorbex®). ניתן ליטול אספירין לתינוקות (81 מיליגרם (מ"ג) ליום) על פי הוראת הרופא.
  - קשיי הנשימה שלו/ה השתפרו או שנסימטו/ה חוזרת למצבה הרגיל.
  - חלפו לפחות 10 ימים מאז בדיקת COVID-19 החיובית הראשונה שלו/ה.
- אם למטופל/ת יש COVID-19 אך איןנו/ה סובל/ת מטאימים, יש להמשיך לעקב אחר הוראות אלה עד ש:
  - חלפו לפחות 10 ימים מאז בדיקת COVID-19 החיובית הראשונה שלו/ה.

אם חוזר אחד מהטאימים של COVID-19, יש להתחילה באופן מיידי לעקב שוב אחר הוראות אלה ולהתקשר לרופא המטפל.

חלק מהמטופלים עלולים להיות מDebuggerים במשך זמן רב לאחר שחלו ב-COVID-19. פירשו של דבר שהם עדיין יכולים להפיץ את הנגיף לאנשים אחרים, גם אם אינם חווים תסמינים כלשהם. המטופל/ת עדיין עלול/ה להיות Debugger אם:

- היה לו/ה מקרה חמור מאוד של COVID-19 והוא/היא היה/תה מאושפז/ת בבית החולים.
- יש לו/ה מערכת חיסונית חלה מאוד (לדוגמה, אם יש לו/ה סרטן דם כגון למפומה או לוכמיה).
- עבר/ה לאחרונה השתלתไต גזע.

אם יש לו/ה מערכת חיסונית חלה מאוד או עבר/ה לאחרונה השתלתไต גזע, יש לשוחח עם הרופא המטפל שלו/ה. יתכן שהוא/ה עבר בבדיקה PCR או בדיקה מהירה כדי לוודא שהוא/היא לא Debugger עדיין.

## **יש להימנע ככל הנימן מגע עם המטופל/ת.**

- יש לדאוג לכך שהמטוסופל/ת ת/ישאר בתוך חדר אחד ו/יתרחק ככל האפשר מאנשים אחרים ומחיות מחמד.
- יש לדאוג לכך שהמטוסופל/ת יעשה/תעשה שימוש בחדר אמבטיה נפרד, במידת האפשר.
- אין לשטוף מוצרי אלקטרוני אלקטרוני (כגון טלפון סלולרי או טאבלט) כלים, כוסות שתייה, ספלים, כלי אוכל, מגבות או מצעים עם המטוטופל/ת.
- אם יש צורך לשחות עם המטוטופל/ת באותו חדר:
  - ככל הניתן, יש להישאר במרחב של 2 מטר לפחות.
  - יש לעוטות מסכה צמודה על גבי האף והפה, במידת האפשר.
  - יש לפתח את החלונות ולהדליק מאורר כדי לסיע בזרימת האוויר.

## **יש לנוקות את הידיים לעיטים תכופות**

- יש לנוקות הידיים לפני ואחרי נגיעה במטוטופל/ת, נגעה בכל דבר שנמצא השירות סביב המטוטופל/ת, או כניסה לחדר בו המטוטופל/ת שוהה.
- במקרה של שטיפת הידיים במים וסבון, יש להרטיב את הידיים ולמרוח עליהם סבון. יש לשפשף היטב את הידיים במשך 20 שניות לפחות ואז לשטוף. יש ליבש את הידיים במגבת ניר חד פעמית ולהשתמש באותה מגבת בצדדי לסגור את הברז. אם אין ברשותך מגבות חד פעימות, ניתן להשתמש במגבות بدנקיות. יש להחליפן כשהן רטובות.
- במקרה של שימוש בחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול, יש להקפיד לכוסות את כל הידיים, ולשפוף אותן עד שהן יבשות.

## **יש לעוטות מסכה צמודה היטב, כפפות, או שניים**

- יש לעוטות מסכה צמודה על גבי האף והפה בעת שהייה באותו חדר עם המטוטופל/ת. להסרת המסכה:
  1. יש להסיר אותה מאחור מבלי לגעת בקדמת המסכה.
  2. יש לשים אותה יחד עם הקביסה המלוכלת. אם נעשה שימוש במסכה חד פעמית (מסכה בה נעשו שימוש פעמי אחת בלבד), יש להשליך אותה לפחות פעם עם שקיית ומכסה.
  3. יש לנוקות את הידיים באופן מיידי.

למידע נוספת עטית מסכה, ניתן לקרוא את המאמרים - .
- יש להשתמש בכפפות חד פעימות בעת המגע בכלים המלוכלים של המטוטופל/ת, בכל האוכל

או בכביסה או בעת הטיפול או זריקת האשפה. יש להשליך את הcpfות לפחות לאשפה עם שקיית ומכסה. יש לנוקות את הידיים באופן מיידי.

- יש לעשות שימוש במסכת פנים ובcpfות חד פעמיות בעת הטיפול בנוזלי הגוף של המטופל/ת, כגון ליהה, רוק וצואה. להסרת cpfות והמסכה:
  1. קודם כל יש להסיר את cpfות. יש להשליכן לפחות לאשפה עם שקיית ומכסה.
  2. יש לשטוף את הידיים.
- 3. יש להסיר את המסכה. יש להתריר אותה מאחור מבליל לגעת בקדמת המסכה ולהשליך אותה יחד עם הכביסה המלוכלת. אם נעשה שימוש במסכה חד פעמיות יש להשליך אותה לפחות לאשפה עם שקיית ומכסה.
- 4. יש לשטוף את הידיים שוב.

אין לעשות שימוש חוזר במסכת וcpfות חד פעמיות. יש להשליך מסכות, cpfות משומשות ופסולת אחרת לפחות לאשפה עם שקיית ומכסה.

## **ניקוי וחיטוי**

- יש לנוקות ולחטא משטחים בהם נגע/ה המטופל/ת (כגון חדר האמבטיה או השירותים שלו/ה) בעת הצורך. יש להמתין זמן רב ככל האפשר אחרי שהמטופל/ת נגע/ה במשטח. יש לעטות מסכה צמודה היבר וכpfות.
- אם את/ה חולק/ת חדר אמבטיה עם המטופל/ת, יש לנוקות ולחטא אותו בכל פעם שהוא/היא עושה בו שימוש. יש להמתין זמן רב ככל האפשר אחרי שהמטופל/ת השתמשה בו.
- יש לנוקות ולחטא משטחים בהם את/ה נוגע/ת למקומות קרובות (כגון טלפונים, שלט רחוב, דלקרים,>IDiot של דלתות, אביזרי אמבטיה, שירותים, מקלדות, טאבלטים ושולחןונות שלו/ה המיטה) מיידי יום.
- אם המשטח מלוכך, יש לנוקות אותו קודם כל בסבון ובמים או בתרסיס ניקוי ביתי או במגבות. רק לאחר מכן יש לעשות שימוש בחומר חיטוי ביתי. יש לעקוב אחר ההוראות של התווית.
- יש לשטוף היבר כלים, כוסות שתייה, ספלים וכל אוכל בהם השתמש/ה המטופל/ת בסבון ובמים חמימים או במדיח כלים.
- יש להחזיק את הכביסה המלוכלת של המטופל/ת בשקיית כביסה נפרדת. אין לנער את הכביסה המלוכלת של המטופל/ת. יש לכבס בהתאם להוראות שעל התווית תוך שימוש במים

החמים ביותר האפשרים. יש ליבש אותה היטב. יש לשתמש באויר החם ביותר האפשר. בסדר לערבע את הכביסה של המטופל/ת עם כביסה אחרת.

## טיפים לניהול והتمודדות עם מצב מתח

רגשות של דאגה לגבי COVID-19 הם רגשות נורמליים לחוליין, במיוחד אם את/ה או מישחו מהיקרים לך חוליה. תוכל/י לדאוג לעצמך על ידי ביצוע פעולות כגון:

- להתקשר או לשוחח בוידאו עם חבר/ה או אדם שיקר/ה לך.
- להתחיל לעסוק בתחום חדש, או לעשות דברים שלא תמיד היה לך זמן לעשותם.
- להתנתך מחשיפה לחדשות.

לרשوت MSK עומדים אנשי מקצוע רבים, מתנדבים ותוכנויות תמיינה היכולים לסייע בהتمודדות במהלך תקופה זו. למידע נוסף וטיפים נוספים להتمודדות עם מתח, ניתן לקרוא במאמר [התמודדות עם מצב מתח וחדרה הנגרמים על ידי COVID-19](https://www.mskcc.org/he/cancer-care/patient-education/managing-stress-and-anxiety-caused-covid-19) ([www.mskcc.org/he/cancer-care/patient-education/managing-stress-and-anxiety-caused-covid-19](https://www.mskcc.org/he/cancer-care/patient-education/managing-stress-and-anxiety-caused-covid-19)).

## משאבים נוספים

לקבלת מידע נוסף על מה לעשות אם לך או לאדם בביתך יש COVID-19, ניתן לבקר באתר [www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick). לקבלת המידע העדכני ביותר אודות המוכנות של MSK ל-COVID-19, ניתן לבקר באתר [www.mskcc.org/coronavirus](https://www.mskcc.org/coronavirus).

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

למשאבים נוספים אנא בקר/י ב- [www.mskcc.org/pe](https://www.mskcc.org/pe) כדי לחפש בספריה הוירטואלית שלנו.

Managing COVID-19 at Home: Information for Caregivers - Last updated on June 9, 2022  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center